

提要 173：包含單位階梯函數之數學模式的解(I)

茲舉一範例說明包含單位階梯函數 $u(t-a)$ 之數學模式，如何引用 *Laplace* 積分轉換方法推求其解。以 *Laplace* 積分轉換方法解析常微分方程式時，其解析過程如圖 1 所示；以 *Laplace* 積分轉換解析偏微分方程式時，其解析過程如圖 2 所示。

圖 1 的意思是說，若問題為常微分方程式的解析，則引用 *Laplace* 積分轉換方法解析問題時，可將常微分方程式改寫為與參數 s 相關之代數方程式，然後推導出問題於 s 定義域的解，最後再進行適當之 *Laplace* 積分反轉換，即可研討出時間域與 t 變數有關之解。

圖 2 的意思則是說，若問題是屬於偏微分方程式的解析，則引用 *Laplace* 積分轉換方法解析問題時，可將偏微分方程式中之變數 t 改寫為參數 s ，因此，在解析過程當中，雖然仍需面對包含微分項次的解析，但已降低解題的難度，而能得出與參數 s 相關之解，最後再進行適當之 *Laplace* 積分反轉換，即可研討出時間域與 t 變數有關之解。這一部分的討論，在後面的單元於討論偏微分方程式的解析時，會再加以介紹。




圖 1 以 *Laplace* 積分轉換解析常微分方程式之觀念流程圖




圖 2 以 Laplace 積分轉換解析偏微分方程式之觀念流程圖

關於 Laplace 積分轉換方法的應用，一定要記住關鍵的 17 個 Laplace 積分轉換公式，如表 1 所示。

範例一

試解析如下所示振動問題之數學模式：

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 6 \frac{dy}{dt} + 5y = 5u(t-1), \quad y(0) = 0, \quad \frac{dy(0)}{dt} = 1$$

其中 $\frac{d^2 y}{dt^2} + 6 \frac{dy}{dt} + 5y = 5u(t-1)$ 是根據牛頓第二運動定律所建立之控制方程式；當 $t \geq 1s$ 時， $5N$ 之外力才開始作用在物體上； $y(0) = 0$ 表物體之初始位置為平衡位置； $\frac{dy(0)}{dt} = 1$ 指物體之向下初始速度為 $1m/s$ 。本題是擬推求質量為 m 之物體於任意時刻的位移量 $y(t)$ 。

解答：

本題是擬採用 *Laplace* 積分轉換方法加以解析。首先讓控制方程式乘以 e^{-st} ，再對變數 t 作 $[0, \infty)$ 之積分，亦即：

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} + 6 \frac{dy}{dt} + 5y \right) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} 5u(t-1)e^{-st} dt$$

上式等號左邊可改寫為先積分再作相加之運算：

$$\int_0^{\infty} \frac{d^2 y}{dt^2} e^{-st} dt + \int_0^{\infty} 6 \frac{dy}{dt} e^{-st} dt + \int_0^{\infty} 5y e^{-st} dt = \int_0^{\infty} 5u(t-1)e^{-st} dt \quad (1)$$

然後進行部分積分 (*Integration by Part*，或譯為分佈積分) 之運算，此一運算是許多 *Laplace* 積分轉換公式推導時之依據。在前面單元的討論中，已介紹過 $f'(t)$ 與 $f''(t)$ 之 *Laplace* 積分轉換，並將其結果放在表 1 之 17 個公式中，若讀者已背下這 17 個 *Laplace* 積分轉換公式，應能很快知道 $y'(t)$ 與 $y''(t)$ 的結果，由表 1 知，

$L\{y'(t)\} = s \int_0^{\infty} y e^{-st} dt - y(0)$ 、 $L\{y''(t)\} = s^2 \int_0^{\infty} y e^{-st} dt - sy(0) - \frac{dy(0)}{dt}$ 。另外，因為 $L\{u(t-a)\} = e^{-as}/s$ ，所以 $L\{u(t-1)\} = e^{-s}/s$ 。基於此，式(1)可改寫為：

$$\left[s^2 \int_0^{\infty} y e^{-st} dt - sy(0) - \frac{dy(0)}{dt} \right] + 6 \left[s \int_0^{\infty} y e^{-st} dt - y(0) \right] + 5 \int_0^{\infty} y e^{-st} dt = \frac{5e^{-s}}{s} \quad (2)$$

再將問題之初始條件 $y(0) = 0$ 、 $\frac{dy(0)}{dt} = 1$ 代入上式，則可得：

$$\left[s^2 \int_0^{\infty} y e^{-st} dt - 1 \right] + 6s \int_0^{\infty} y e^{-st} dt + 5 \int_0^{\infty} y e^{-st} dt = \frac{5e^{-s}}{s} \quad (3)$$

上式即為圖 1 所示解析流程圖中之第二個部分。經整理後，可得：

$$(s^2 + 6s + 5) \int_0^{\infty} y e^{-st} dt = \frac{5e^{-s}}{s} + 1 \quad (4)$$

亦即：

$$\int_0^{\infty} y e^{-st} dt = \frac{5e^{-s}}{s(s^2 + 6s + 5)} + \frac{1}{s^2 + 6s + 5} \quad (5)$$

上式稱為問題於 *Laplace* 積分轉換域之解，通常以符號 $Y(s)$ 表示之。也就是說，問題於 s 定義域之解為：

$$Y(s) = \frac{5e^{-s}}{s(s^2 + 6s + 5)} + \frac{1}{s^2 + 6s + 5} \quad (6)$$

上式即為圖 1 所示解析流程圖中之第三個部分。以下需進行 *Laplace* 積分反轉換，通常，這是整個解析過程中最困難的部分，說明如下。進行式(6)之 *Laplace* 積分反轉換有兩種方法，一是直接引用 *Laplace* 積分反轉換之定義，亦即 $y(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\alpha-i\infty}^{\alpha+i\infty} Y(s)e^{st} ds$ ，但是此一積分式之計算，與複數變數之積分有關，目前大部分的讀者都尚未學過複變分析，所以無能為力；二是引用所背下來的 17 個 *Laplace* 積分反轉換公式，如表 1 所示，姑且將此一方法稱為「**背影法**」。亦即，1 的背影是 $1/s$ ，因此看到 $1/s$ 時，就想到它是 1 的背影，所以 $1/s$ 的 *Laplace* 反轉換就是 1；又例如 $\cos(at)$ 的 *Laplace* 轉換是 $s/(s^2 + a^2)$ ，因此看到 $s/(s^2 + a^2)$ 時，就想到它是 $\cos(at)$ 的背影，所以 $s/(s^2 + a^2)$ 的 *Laplace* 反轉換就是 $\cos(at)$ 。其餘之各種 *Laplace* 轉換關係式，亦可依此方式加以解釋。

式(6)可改寫為簡單之部分分式：

$$Y(s) = \left(\frac{a}{s} + \frac{b}{s+1} + \frac{c}{s+5} \right) e^{-s} + \frac{d}{s+1} + \frac{e}{s+5} \quad (6')$$

通分後，可得：

$$Y(s) = \frac{a(s+1)(s+5) + bs(s+5) + cs(s+1)}{s(s+1)(s+5)} e^{-s} + \frac{d(s+5) + e(s+1)}{(s+1)(s+5)} \quad (7)$$

比較係數後可知：

$$\begin{cases} a+b+c=0 \\ 6a+5b+c=0 \\ 5a=5 \\ d+e=0 \\ 5d+e=1 \end{cases}$$

解析此聯立代數方程式可得： $a=1$ 、 $b=-\frac{5}{4}$ 、 $c=\frac{1}{4}$ 、 $d=\frac{1}{4}$ 、 $e=-\frac{1}{4}$ 。亦即：

$$Y(s) = \left(\frac{1}{s} + \frac{-5/4}{s+1} + \frac{1/4}{s+5} \right) e^{-s} + \frac{1/4}{s+1} + \frac{-1/4}{s+5} \quad (8)$$

因此問題於時間域 t 之解為：

$$y(t) = L^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{s} \right\} - \frac{5}{4} L^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{s+1} \right\} + \frac{1}{4} L^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{s+5} \right\} + \frac{1}{4} L^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} - \frac{1}{4} L^{-1} \left\{ \frac{1}{s+5} \right\} \quad (9)$$

由表 1 知：

$$L^{-1} \left\{ e^{-as} F(s) \right\} = f(t-a)u(t-a), \quad L^{-1} \left\{ \frac{1}{s-a} \right\} = e^{at}$$

所以：

$$L^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{s} \right\} = u(t-1)$$

$$L^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{s+1} \right\} = L^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\}_{t=t-1} u(t-1) = [e^{-t}]_{t=t-1} u(t-1) = e^{-(t-1)} u(t-1)$$

$$L^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{s+5} \right\} = L^{-1} \left\{ \frac{1}{s+5} \right\}_{t=t-1} u(t-1) = [e^{-5t}]_{t=t-1} u(t-1) = e^{-5(t-1)} u(t-1)$$

$$L^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} = e^{-t}$$

$$L^{-1}\left\{\frac{1}{s+5}\right\} = e^{-5t}$$

故問題之解為：

$$y(t) = \left[1 - \frac{5}{4}e^{-(t-1)} + \frac{1}{4}e^{-5(t-1)}\right]u(t-1) + \frac{1}{4}(e^{-t} - e^{-5t})$$

範例二

試解析如下所示振動問題之數學模式：

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 6\frac{dy}{dt} + 5y = u(t-1), \quad y(0) = 0, \quad \frac{dy(0)}{dt} = 1$$

其中 $\frac{d^2y}{dt^2} + 6\frac{dy}{dt} + 5y = u(t-1)$ 是根據牛頓第二運動定律所建立之控制方程式；當 $t \geq 1s$ 時， $1N$ 之外力才開始作用在物體上； $y(0) = 0$ 表物體之初始位置為平衡位置； $\frac{dy(0)}{dt} = 1$ 指物體之向下初始速度為 $1m/s$ 。本題是擬推求質量為 m 之物體於任意時刻的位移量 $y(t)$ 。

解答：

本題是擬採用 *Laplace* 積分轉換方法加以解析。首先讓控制方程式乘以 e^{-st} ，再對變數 t 作 $[0, \infty)$ 之積分，亦即：

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{d^2y}{dt^2} + 6\frac{dy}{dt} + 5y \right) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} u(t-1) e^{-st} dt$$

上式等號左邊可改寫為先積分再作相加之運算：

$$\int_0^{\infty} \frac{d^2y}{dt^2} e^{-st} dt + \int_0^{\infty} 6\frac{dy}{dt} e^{-st} dt + \int_0^{\infty} 5y e^{-st} dt = \int_0^{\infty} u(t-1) e^{-st} dt \quad (1)$$

然後進行部分積分 (*Integration by Part*，或譯為分佈積分) 之運算，此一運算是許多 *Laplace* 積分轉換公式推導時之依據。在前面單元的討論中，已介紹過 $f'(t)$ 與 $f''(t)$ 之 *Laplace* 積分轉換，並將其結果放在表 1 之 17 個公式中，若讀者已背下這 17 個 *Laplace* 積分轉換公式，應能很快知道 $y'(t)$ 與 $y''(t)$ 的結果，由表 1 知，

$L\{y'(t)\} = s \int_0^{\infty} y e^{-st} dt - y(0)$ 、 $L\{y''(t)\} = s^2 \int_0^{\infty} y e^{-st} dt - sy(0) - \frac{dy(0)}{dt}$ 。另外，因為 $L\{u(t-a)\} = e^{-as}/s$ ，所以 $L\{u(t-1)\} = e^{-s}/s$ 。基於此，式(1)可改寫為：

$$\left[s^2 \int_0^{\infty} y e^{-st} dt - sy(0) - \frac{dy(0)}{dt} \right] + 6 \left[s \int_0^{\infty} y e^{-st} dt - y(0) \right] + 5 \int_0^{\infty} y e^{-st} dt = \frac{e^{-s}}{s} \quad (2)$$

再將問題之初始條件 $y(0)=0$ 、 $\frac{dy(0)}{dt}=1$ 代入上式，則可得：

$$\left[s^2 \int_0^\infty y e^{-st} dt - 1 \right] + 6s \int_0^\infty y e^{-st} dt + 5 \int_0^\infty y e^{-st} dt = \frac{e^{-s}}{s} \quad (3)$$

上式即為圖 1 所示解析流程圖中之第二個部分。經整理後，可得：

$$(s^2 + 6s + 5) \int_0^\infty y e^{-st} dt = \frac{e^{-s}}{s} + 1 \quad (4)$$

亦即：

$$\int_0^\infty y e^{-st} dt = \frac{e^{-s}}{s(s^2 + 6s + 5)} + \frac{1}{s^2 + 6s + 5} \quad (5)$$

上式稱為問題於 *Laplace* 積分轉換域之解，通常以符號 $Y(s)$ 表示之。也就是說，問題於 s 定義域之解為：

$$Y(s) = \frac{e^{-s}}{s(s^2 + 6s + 5)} + \frac{1}{s^2 + 6s + 5} \quad (6)$$

上式即為圖 1 所示解析流程圖中之第三個部分。以下需進行 *Laplace* 積分反轉換，通常，這是整個解析過程中最困難的部分，說明如下。進行式(6)之 *Laplace* 積分反轉換有兩種方法，一是直接引用 *Laplace* 積分反轉換之定義，亦即 $y(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\alpha-i\infty}^{\alpha+i\infty} Y(s)e^{st} ds$ ，但是此一積分式之計算，與複數變數之積分有關，目前大部分的讀者都尚未學過複變分析，所以無能為力；二是引用所背下來的 17 個 *Laplace* 積分反轉換公式，如表 1 所示，姑且將此一方法稱為「**背影法**」。亦即，1 的背影是 $1/s$ ，因此看到 $1/s$ 時，就想到它是 1 的背影，所以 $1/s$ 的 *Laplace* 反轉換就是 1；又例如 $\cos(at)$ 的 *Laplace* 轉換是 $s/(s^2 + a^2)$ ，因此看到 $s/(s^2 + a^2)$ 時，就想到它是 $\cos(at)$ 的背影，所以 $s/(s^2 + a^2)$ 的 *Laplace* 反轉換就是 $\cos(at)$ 。其餘之各種 *Laplace* 轉換關係式，亦可依此方式加以解釋。

式(6)可改寫為簡單之部分分式：

$$Y(s) = \left(\frac{a}{s} + \frac{b}{s+1} + \frac{c}{s+5} \right) e^{-s} + \frac{d}{s+1} + \frac{e}{s+5} \quad (6')$$

通分後，可得：

$$Y(s) = \frac{a(s+1)(s+5) + bs(s+5) + cs(s+1)}{s(s+1)(s+5)} e^{-s} + \frac{d(s+5) + e(s+1)}{(s+1)(s+5)} \quad (7)$$

比較係數後可知：

$$\begin{cases} a+b+c=0 \\ 6a+5b+c=0 \\ 5a=1 \\ d+e=0 \\ 5d+e=1 \end{cases}$$

解析此聯立代數方程式可得： $a = \frac{1}{5}$ 、 $b = -\frac{1}{4}$ 、 $c = \frac{1}{20}$ 、 $d = \frac{1}{4}$ 、 $e = -\frac{1}{4}$ 。亦即：

$$Y(s) = \left(\frac{1/5}{s} + \frac{-1/4}{s+1} + \frac{1/20}{s+5} \right) e^{-s} + \frac{1/4}{s+1} + \frac{-1/4}{s+5} \quad (8)$$

因此問題於時間域 t 之解為：

$$y(t) = \frac{1}{5} L^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{s} \right\} - \frac{1}{4} L^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{s+1} \right\} + \frac{1}{20} L^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{s+5} \right\} + \frac{1}{4} L^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} - \frac{1}{4} L^{-1} \left\{ \frac{1}{s+5} \right\} \quad (9)$$

由表 1 知：

$$L^{-1} \{ e^{-as} F(s) \} = f(t-a) u(t-a), \quad L^{-1} \left\{ \frac{1}{s-a} \right\} = e^{at}$$

所以：

$$L^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{s} \right\} = u(t-1)$$

$$L^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s+1}\right\} = L^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\}_{t=t-1} \quad u(t-1) = [e^{-t}]_{t=t-1} u(t-1) = e^{-(t-1)} u(t-1)$$

$$L^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s+5}\right\} = L^{-1}\left\{\frac{1}{s+5}\right\}_{t=t-1} \quad u(t-1) = [e^{-5t}]_{t=t-1} u(t-1) = e^{-5(t-1)} u(t-1)$$

$$L^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} = e^{-t}$$

$$L^{-1}\left\{\frac{1}{s+5}\right\} = e^{-5t}$$

故問題之解為：

$$y(t) = \left[\frac{1}{5} - \frac{1}{4} e^{-(t-1)} + \frac{1}{20} e^{-5(t-1)} \right] u(t-1) + \frac{1}{4} (e^{-t} - e^{-5t})$$

表 1 常用之 17 個 Laplace 積分轉換暨反轉換公式

$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^2	$\frac{2}{s^3}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2-a^2}$
$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2-a^2}$
$\cos(at)$	$\frac{s}{s^2+a^2}$
$\sin(at)$	$\frac{a}{s^2+a^2}$
$f'(t)$	$sF(s) - f(0) = s \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt - f(0)$
$f''(t)$	$s^2F(s) - sf(0) - f'(0) = s^2 \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt - sf(0) - f'(0)$
$f^{(n)}(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$ 其中 $F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt$
$u(t-a)$	$\frac{e^{-as}}{s}$
$\delta(t-a)$	e^{-as}
$e^{at} f(t)$	$F(s-a) = \int_0^\infty f(t)e^{-(s-a)t} dt$
$f(t-a)u(t-a)$	$e^{-as}F(s) = e^{-as} \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt$
$\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$	$F(s)G(s) = \left[\int_0^\infty f(t)e^{-st} dt \right] \left[\int_0^\infty g(t)e^{-st} dt \right]$